

Recapiti per la segnalazione

ASL Città di Torino: simi@aslcitytorino.it
011.5663137/5663152

ASL TO3: sisp.direzione@aslto3.piemonte.it
011.9551720/1755 (Collegno, Rivoli)
0121.235400 (Pinerolo)

ASL TO4:
sisp.ivrea@aslto4.piemonte.it
0125.414713 (Ivrea)
sisp.settimo@aslto4.piemonte.it
011.8212308 (Settimo T.)
sispvaccinazioni.cirie@aslto4.piemonte.it
011.4211606 (Cirié)

ASL TO5: sisp@aslto5.piemonte.it
011.9719442/9441 (Carmagnola)
011.6806806/6876 (Nichelino-Moncalieri)
011.94293656/3638 (Chieri)

ASL VC: sisp@aslvc.piemonte.it
0161.593030/32
0163.426721

ASL BI: prevenzione@aslbi.piemonte.it
015.15159255

ASL NO: simi.novara@asl.novara.it
0321.374309/4306

ASL VCO:
sisp.vb@aslvc.it 0323.541441 (Verbanò)
sisp.om@aslvc.it 0323.868040 (Cusio)
sisp.do@aslvc.it 0324.491677 (Ossola)

ASL CN1: sisp@aslcn1.it
0171.450381 (Cuneo)
0174.676143 (Mondovì)
0175.215613 (Saluzzo)
0172.699251 (Fossano)
0172.240679 (Savigliano)

ASL CN2: vaccinazioni.alba@aslcn2.it
0173.594837

ASL AT: simi@asl.at.it
0141.484943/4953/4973

ASL AL: sisp@aslal.it
0131.307819 (Alessandria)
0142.434549 (Casale M.to);
0143.332638 (Novi L.); fax: 0143.332636

SITI UTILI

European Centre for Disease Prevention and Control:
<http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx>

Il portale del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=7&area=Malattie_infezive

Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica:
<http://www.epicentro.iss.it/>

Il portale medico e scientifico sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana di Igiene:
<http://www.vaccinarsi.org/>

PERTOSSE

GUIDA ALLA SEGNALAZIONE

La pertosse è una infezione respiratoria acuta, molto seria e altamente contagiosa, causata dal batterio *Bordetella pertussis*.

Talvolta decorre in modo inapparente, ma in alcuni casi (soprattutto nei bambini piccoli) può manifestarsi con quadri clinici estremamente gravi che richiedono spesso l'ospedalizzazione. Negli adolescenti e negli adulti a causa del quadro clinico atipico, dei sintomi più lievi e dello scarso ricorso alla conferma di laboratorio, spesso non viene diagnosticata ed è pertanto sottostimata.

A differenza delle altre malattie infantili, l'immunità conferita da una prima infezione o dalla vaccinazione non è definitiva, ma declina col tempo; è per tale motivo che ogni 10 anni è raccomandata una dose vaccinale di richiamo.

I neonati non ancora vaccinati costituiscono la categoria maggiormente a rischio ed è per questo che viene raccomandata la vaccinazione della donna in gravidanza preferibilmente tra la 27° e la 36° settimana.

L'aumento del numero di casi porta a considerare la pertosse come una malattia riemergente e suggerisce la necessità di promuovere una sorveglianza attiva basata sulla conferma di laboratorio della diagnosi clinica

PERTOSSE: cosa segnalare

Qualsiasi individuo con tosse di durata almeno di 2 settimane e almeno 1 dei seguenti sintomi:

- tosse parossistica,
- urlo inspiratorio,
- vomito post-tussivo;

OPPURE

Qualsiasi individuo con una diagnosi clinica di pertosse

OPPURE

Presenza di episodi apneici in neonati

A chi segnalare

Le segnalazioni devono essere trasmesse (via e-mail o per telefono) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di riferimento.

Quando segnalare

La segnalazione deve essere effettuata entro 48 ore dal sospetto.

Quali informazioni trasmettere alla ASL

Nome, Cognome, Data di nascita, Data di inizio sintomi e Patologia sospetta

Cosa dire al paziente

È importante che il clinico informi il paziente sull'evoluzione della malattia e sui passi successivi alla segnalazione.

Per confermare il caso sospetto sono necessarie appropriate indagini di laboratorio (tampone nasofaringeo e sangue).

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL contatterà il paziente per rivolgergli alcune domande necessarie per acquisire ulteriori dati utili per l'indagine epidemiologica.